

# Rochester Gastroenterology Associates, LLP

Prasad Penmetsa, M.D., M.R.C.P.  
Surinder Deygun, M.D.  
Ari Chodos, M.D.  
Marvin Singh, M.D.  
Muddusir Ayaz, M.D.  
Amy Hayes, F.N.P.-C.  
Sarah Pratt, F.N.P.-C.  
Michelle Addison, F.N.P.-C.

[www.rochestergastro.com](http://www.rochestergastro.com)

## **INSTRUCCIONES PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD)**

Nombre \_\_\_\_\_ Procedimiento \_\_\_\_\_

**USTED A SIDO PROGRAMADO PARA ESTE EXAME A TRAVES DE EL DR \_\_\_\_\_  
OR FAVOR REPORTE A**

**Unity Hospital Endoscopy Center**  
1555 Long Pond Road  
Rochester, NY 14626  
Tel: (585) 723-7119

**Rochester Gastro. Assoc.**  
20 Hagen Dr., Suite 330  
Rochester, NY 14625  
Tel: (585) 267-4040

**REPORTE Y REGISTRA A:**

**FECHA/DIA:**

### **POR FAVOR, REVISE TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL RECIBO**

Arreglos de transporte deben hacerse para que alguien recoja y acompañarte a casa. **DEBIDO A QUE ESTA SE UNA LEY DEL ESTADO DE NUEVA YORK. ¡NO PUEDE HABER EXCEPCIONES!**

Usted debe arreglar para que un vecino, amigo o miembro de la familia a permanecer con usted después de su llegada hogar dado que los efectos de sedación pueden durar bien entrada la noche.

Si usted es incapaz de mantener su cita programada, cancelación se aprecia **48 horas** de anticipación llamando al **(585)267-4040** o **(585)227-1080** entre **8:30 a.m.** y **4:30 p.m.** Si usted no nos notifica que puede cargarse. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a estos teléfonos.

Si usted está tomando *cualquier* tipo de medicamentos anticoagulantes, como **COUMADIN, PLAVIX, ELIQUIS, o XARELTO**, informar **INMEDIATAMENTE** a nuestra oficina al (585)267-4040 o (585)227-1080. **Estos medicamentos deben suspenderse COMO DIRECTED POR SU MÉDICO.**

1. Si toma semaglutida, dulaglutida (Ozempic, Trulicity y Wegovy) o cualquier otro medicamento GLP-1, deje de tomarlos 1 semana antes de su procedimiento si es una dosis semanal o 1 día antes si es una dosis diaria.
2. No hay **NADA** que comer ni beber después de medianoche la noche antes del procedimiento. Si su procedimiento es después de **12:00 p.m.** pueden consumirse más líquidos claros hasta 4 horas antes del procedimiento programado.
3. Todos los medicamentos se pueden tomar en el día del procedimiento con una cantidad mínima de agua temprano en la mañana. Por favor consulte con nosotros antes de tomar cualquier **INSULINA** o cualquier otro medicamento diabético en la mañana del examen.

**Gracias por la oportunidad de acomodar su atención de salud necesita.**

(06/24)